

Nuovo

VetNova

La separazione capita...
L'ansia non necessariamente.



Reconcile®
cloridrato di fluoxetina

Ansia da **separazione**

L'ansia da separazione è la seconda patologia comportamentale canina più comune.¹

Dal 14% al 17% dei cani sono affetti da ansia da separazione.^{3,4} L'ansia da separazione può svilupparsi a qualsiasi età in entrambi i sessi ed è stata diagnosticata in tutte le razze.

I cani con ansia da separazione non sono dispettosi o cattivi, ma soffrono di una patologia medica curabile.




Cos'è l'ansia da separazione?

Quando i cani sono ansiosi, spesso cercano informazioni che li aiutino a ridurre la loro incertezza. Per i cani da compagnia una delle migliori fonti di informazione e guida è chi si prende cura di loro, così vanno ad annusare, leccare o si appoggiano al loro padrone nel tentativo di scoprire se devono preoccuparsi. Se chi se ne prende cura non è presente, il cane può sentirsi molto angosciato. Non solo sono preoccupati, ma non hanno modo di superare la loro ansia perché la loro fonte di informazione non c'è. Possono fare dei tentativi per avere accesso a chi si prende cura di loro con comportamenti di vocalizzazione, come ululare o

abbaiare, e distruzione, come graffiare e scavare vicino alle porte. Altri livelli di ansia irrisolta possono anche avere effetti fisiologici che causano la perdita del controllo degli sfinteri (minzione o defecazione in casa), affanno e/o salivazione eccessiva. Quando i livelli di eccitazione emotiva aumentano, i cani hanno bisogno di liberarsi attraverso una combinazione di comportamenti di scarico e di spostamento, ad esempio masticando e distruggendo oggetti domestici (comportamento di scarico); sbadigliando, camminando e/o girando in tondo (comportamento di spostamento).

Comportamenti indesiderati che possono presentarsi nei cani con ansia da separazione.⁶



Purtroppo i comportamenti distruttivi possono provocare danni alla proprietà del proprietario, autolesionismo del cane, rottura del legame uomo-animale e, quando si tratta di vocalizzazione, lamenti da parte dei vicini.⁷ Di solito questi comportamenti negativi si verificano quando chi si prende cura del cane esce di casa, e i periodi di tranquillità possono alternarsi con l'abbaiare e il comportamento distruttivo ogni 40-60 minuti.^{2,7,8}

Questi comportamenti negativi sono le ragioni più comuni per le quali proprietari scelgono di abbandonare o sopprimere i loro cani.² Il 40% dei cani lasciati nei rifugi per animali ha almeno un problema comportamentale.⁵

È importante ricordare che lo stress legato alla separazione può portare a risposte comportamentali più passive che sono più difficili da identificare. Per esempio, alcuni soggetti non riescono a mangiare alcun cibo a loro lasciato fino al ritorno della persona che se ne prende cura e questa inappetenza può essere un segno di ansia. Altri potrebbero avere lasciato tracce di saliva, ma ciò può essere facilmente superato.

Quali sono i potenziali **fattori di rischio**?

I potenziali fattori scatenanti includono:



PREDISPOSIZIONE EREDITARIA



NUOVA PERSONA CHE SE NE PRENDE CURA O NUOVA FAMIGLIA



PRIME ESPERIENZE LIMITATE



INVECCHIAMENTO E DECLINO COGNITIVO



ANSIA E PAURA SITUAZIONALI PER ESEMPIO, SENSIBILITÀ AL RUMORE/ ALLE TEMPESTE



ALTERAZIONE DELLA STRUTTURA FAMILIARE ATTRAVERSO LA NASCITA O LA MORTE



CAMBIAMENTI NELL'ORARIO DI LAVORO O NELLA ROUTINE QUOTIDIANA DELLA PERSONA CHE SE NE PRENDE CURA



ANSIA GENERALIZZATA



TRASFERIRSI IN UN'ALTRA RESIDENZA



PROBLEMI DI SALUTE FISICA, PER ESEMPIO, DOLORE CRONICO

Come viene diagnosticata l'ansia da **separazione**?

Le persone che se ne prendono cura dovrebbero essere incoraggiate a prendere un appuntamento presso la clinica veterinaria se sono preoccupate per il comportamento del loro animale domestico in loro assenza, poiché c'è più di una ragione per cui i cani possono sentirsi turbati quando sono soli. Le riprese video del cane quando viene lasciato solo sono preziose per classificare il comportamento osservato.



È fondamentale che venga effettuato un check-up completo della salute fisica, poiché la salute emotiva e quella fisica sono inestricabilmente legate. I test di laboratorio, come un emocromo completo, un esame biochimico, un test della tiroide e un'analisi delle urine possono essere appropriati per determinare altre potenziali cause sottostanti al comportamento.

Intervento del veterinario

È molto importante avere una diagnosi accurata della motivazione di fondo prima di iniziare la cura farmacologica, poiché sono coinvolti diversi neurotrasmettitori. Non tutti i comportamenti legati alla separazione sono causati dall'ansia e gli ansiolitici non sono quindi appropriati per tutti i casi. Tuttavia, quando c'è l'ansia, l'uso di ansiolitici può essere estremamente utile perché rende più facile per il cane beneficiare della modifica comportamentale e imparare che si può stare al sicuro quando si è soli.

L'indagine completa dei casi comportamentali può essere effettuata internamente da un professionista veterinario o attraverso il rinvio a un comportamentista veterinario adeguatamente qualificato. Se si scopre che il cane ha una salute emotiva compromessa e l'ansia è diagnosticata come la motivazione emotiva sottostante ai segnali comportamentali problematici,

allora i farmaci possono essere appropriati. Gli inibitori selettivi della ricaptazione di serotonina di serotonina (SSRI) (es. Reconcile®) aumentano la disponibilità di serotonina e hanno dimostrato di essere benefici per questi pazienti.



Come aiutare questi cani che sono ansiosi **quando vengono lasciati soli?**

La gestione dello stress da separazione inizia con la creazione di stabilità emotiva e la riduzione dell'ansia generalizzata. Affrontare i comportamenti quando la persona che se ne prende cura è a casa è importante prima di procedere a trattare il comportamento in sua assenza. È anche importante insegnare ai cani ad essere indipendenti e rilassati quando sono da soli.

Modificare l'aspettativa dell'assistenza della persona che se ne prende cura nella risoluzione dei problemi può insegnare al cane a trovare soluzioni quando

questa persona non è disponibile ed essere in grado di prevedere quando qualcuno è disponibile o meno aiuterà a ridurre l'incertezza.

Un cane con ansia da separazione non è un caso disperato. Quando è chiaro che i comportamenti non sono causati da un problema fisico, l'uso di un piano di trattamento comportamentale che include i farmaci può aiutare il cane interessato a diventare meno ansioso e più rilassato in assenza della persona che se ne prende cura.⁶

Ottenere aiuto per i cani che soffrono di ansia quando vengono lasciati soli è davvero importante dal punto di vista del benessere sia per il cane che per chi lo accudisce. Chi se ne prende cura dovrebbe essere incoraggiato a chiedere aiuto alla propria clinica veterinaria non appena nota dei segnali. Questi problemi peggiorano con il tempo e i programmi di modifica del comportamento saranno più efficaci quanto prima verranno iniziati.

La modifica del comportamento è una parte importante della gestione dei disturbi legati alla separazione nei cani. Un approccio tradizionale per la modifica del comportamento di questi cani si basava sulla necessità di ridimensionare la prevedibilità della partenza. Ma oggi conosciamo l'importanza della prevedibilità e del controllo, che ha portato a un approccio diverso ai problemi di separazione, dove ai cani viene dato un chiaro

segnale di volontà di partenza.¹⁴ Questi nuovi modi di pensare alla gestione dei comportamenti legati alla separazione sono stati incorporati nel programma CALM®.

Il programma CALM® è formato da 4 fasi create per aiutare in 4 fasi che è stato creato per aiutare la persona che se ne occupa a prevenire e a gestire i disturbi legati alla separazione nel proprio cane.

Il Programma **CALM**[®]

Il programma CALM[®] è stato creato dalla Veterinaria europea specializzata in medicina comportamentale RCVS e EBVS[®], Dott.ssa Sarah Heath BVSc PgCertVE Dip. ECAWBM(BM) CCAB FHEA FRCVS. Il programma CALM aiuta sia la prevenzione che la gestione dei comportamenti legati alla separazione, in 4 passaggi:



C

CREARE STABILITÀ EMOTIVA

- Considerare il comportamento del cane quando non è solo: essere in grado di controllare le sue emozioni lo aiuta ad affrontare i periodi di solitudine.
- L'ansia è legata alla scarsa fiducia in se stessi. Lavorare per rafforzare la capacità del cane di prendere decisioni da solo e di far fronte alle novità e ai cambiamenti, perché questo aiuta a ridurre il rischio di ansia.
- Premiare il cane per aver preso buone decisioni e metterlo in condizione di avere successo. Chi si prende cura del cane può farlo incoraggiandolo a giocare da solo con i giocattoli e premiando un comportamento calmo e tranquillo.
- Ricordare che chi si prende cura del cane dovrebbe evitare interazioni che potrebbero essere percepite come conflittuali: evitare voci alte e severe e non punire comportamenti che sono avvenuti in sua assenza.

A

ALTERARE L'ASPETTATIVA DI INTERAZIONE

- Chi se ne prende cura ama condividere la compagnia del proprio cane e c'è la tentazione di passare ogni minuto insieme quando si è a casa. Ciò può portare ad aspettative irrealistiche di compagnia e a rendere il cane dipendente da chi si prende cura di lui per farlo sentire al sicuro.
- Quando i cuccioli sono molto giovani, è importante che passino un po' di tempo da soli con giocattoli appropriati che li facciano sentire felici e occupati.
- Quando i cani sono insicuri cercano informazioni e spesso cercano di ottenerle dall'uomo attraverso comportamenti come appoggiarsi, scalpitare, accarezzare, annusare e leccare. Se diventano dipendenti da queste informazioni, è più probabile che siano ansiosi quando chi si prende cura di loro non è disponibile.
- La persona che si prende cura del cane non dovrebbe mai rifiutare o ignorare queste richieste di aiuto, ma rispondere in modo calmo e passivo in modo da aiutare il cane a superare la sua insicurezza.
- I cani ansiosi offriranno informazioni anche rotolandosi sulla schiena o urinando.
- Le persone che se ne prendono cura non dovrebbero incoraggiare comportamenti di ricerca di informazioni o di offerta, ma premiare il cane quando comincia a diventare più sicuro di sé, come quando smette di leccare la mano o il cane si alza dopo essersi rotolato sulla schiena.

L

LASCIARE SEGNALI PREDITTIVI CHE DANNO LA CERTEZZA DEL RITORNO

- La prevedibilità e il controllo aiutano a ridurre l'ansia, quindi è importante permettere al cane di prevedere la partenza e il ritorno di chi si prende cura di lui.
- La persona che se ne prende cura dovrebbe fornire un segnale visivo che non è disponibile e rimuovere questo segnale al suo ritorno.
- Introdurre questo segnale al cane lentamente e con attenzione usando brevi periodi di allontanamento pianificato in un luogo sicuro, confortevole e rilassante. Quando la persona che si prende cura del cane ritorna, dovrebbe rimuovere il segnale prima di interagire con il suo cane.
- Se il cane è già stressato quando esce, è utile ridurre al minimo i momenti in cui questo è necessario, se possibile.
- Se il cane deve essere lasciato, la persona che lo accudisce dovrebbe scegliere un luogo diverso dal luogo sicuro per l'addestramento e lasciare un segnale visivo diverso.

M

MODIFICARE LA SALUTE EMOTIVA SOTTOSTANTE, SE NECESSARIO

- Modificare la neurochimica del cane e aumentare la disponibilità di serotonina, per esempio usando Reconcile[®], per aiutare a ridurre l'ansia.
- I farmaci sono solo una parte dell'approccio e devono essere usati ad un programma di modifica del comportamento.

Introdurre **Reconcile®**

Reconcile®, una compressa masticabile aromatizzata che contiene fluoxetina cloridrato, è stata sviluppata appositamente per i cani con disturbi legati alla separazione.

Le compresse masticabili Reconcile sono autorizzate come aiuto nel trattamento dei disturbi legati alla separazione nei cani che manifestano distruzione e comportamenti distruttivi inappropriati (vocalizzazione e defecazione e/o minzione inappropriata) e solo in combinazione con tecniche di modifica del comportamento¹² Reconcile® è un farmaco soggetto a prescrizione medica e quindi deve essere prescritto da un veterinario.




Come funziona **Reconcile®**?

I neurotrasmettitori, come la serotonina, sono rilasciati dal neurone presinaptico e si attaccano ai recettori sul sito postsinaptico.

Vengono poi riassorbiti nel sito presinaptico. La ricerca ha dimostrato che il controllo dell'ansia è una delle funzioni della serotonina.

Reconcile®, un inibitore selettivo della ricaptazione di serotonina (SSRI), aiuta a correggere lo squilibrio bloccando il ricaptazione della serotonina e aumentando temporaneamente il livello nella sinapsi.


Reconcile® aiuta a stabilire uno stato d'animo più calmo nei cani, riducendo i comportamenti dannosi e rendendoli più ricettivi all'addestramento.



Reconcile® è efficace?

È stato condotto uno studio multicentrico, in doppio cieco, su 229 cani per 70 giorni, con il dosaggio dei cani partecipanti per 56 giorni (14 giorni prima del trattamento), per confrontare la compressa masticabile Reconcile® con una compressa di controllo placebo.¹¹ Entrambi i gruppi hanno avuto una modifica del comportamento. Dopo 1 settimana un numero significativamente maggiore di cani che avevano ricevuto Reconcile® presentava un miglioramento significativo.

DATI DI EFFICACIA



Il 73% dei cani con disturbi legati alla separazione ha mostrato un miglioramento misurabile in 8 settimane quando Reconcile® è stato usato con la modifica del comportamento.^{1,11,13}

Dopo 8 settimane, il 73% dei cani che avevano ricevuto Reconcile® presentava un miglioramento significativo rispetto a poco più della metà di quelli che avevano ricevuto solo compresse di controllo con placebo.^{1,11,13}

Poiché Reconcile® è indicato per il trattamento dei disturbi legati alla separazione nei cani solo in combinazione con un piano di modifica del comportamento, a pagina 6 viene discusso un piano di modifica del comportamento suggerito (il programma CALM).

Sicurezza di Reconcile®

Reconcile® è autorizzato negli Stati Uniti da molti anni e l'uso clinico continuo in condizioni reali ha dimostrato che è ben tollerato nei cani. Inoltre molti studi dimostrano che Reconcile® si è dimostrato sicuro se prescritto e usato come indicato.

In uno studio sulla sicurezza condotto in laboratorio in doppio cieco, a 38 cani è stato somministrato Reconcile® per un anno a 0,5x, 2,25x e 10x la dose di trattamento raccomandata per determinare la potenziale tossicità cumulativa e la reversibilità di qualsiasi effetto tossicologico della fluoxetina cloridrato con la somministrazione cronica a cani Beagle.¹⁰

Lo studio ha dimostrato che la fluoxetina ha una risposta di sicurezza variabile e individuale per quanto riguarda gli eventi avversi riportati. Come per tutti i farmaci, è importante monitorare da vicino eventuali effetti collaterali e garantire l'accuratezza del dosaggio per ridurre al minimo il rischio di effetti avversi. Gli eventi avversi più comuni segnalati in ordine decrescente di frequenza sono: diminuzione dell'appetito, disturbi del tratto urinario (cistite, incontinenza urinaria, ritenzione urinaria, stranguria), disturbi del sistema nervoso centrale (scoordinamento, disorientamento), perdita di peso/perdita di condizione, midriasi, affanno, convulsioni, vomito.¹²

FAQ

Che dose devo usare?¹²

Reconcile® viene somministrato una volta al giorno, il che è ideale per la massima conformità. Viene somministrato per via orale a una dose giornaliera da 1 a 2 mg/kg di peso corporeo secondo la tabella di dosaggio riportata di seguito:

PESO CORPOREO (KG)	DOSAGGIO DELLA COMPRESSA (MG)	N° DI COMPRESSE AL GIORNO
4 - 8	Reconcile® compressa da 8mg	1
> 8 - 16	Reconcile® compressa da 16mg	1
> 16 - 32	Reconcile® compressa da 32mg	1
> 32 - 64	Reconcile® compressa da 64mg	1

Devo dare le compresse con il cibo?¹²

Le compresse di Reconcile® possono essere somministrate con o senza cibo. Le compresse sono aromatizzate e la maggior parte dei cani consuma la compressa quando gli viene offerta da chi se ne prende cura.

In quanto tempo dovrei aspettarmi di vedere una risposta?¹²⁻¹³

Il miglioramento clinico con il prodotto è previsto entro 1 o 2 settimane. Se non si nota alcun miglioramento entro 4 settimane, la gestione del caso dovrebbe essere rivalutata.

Ci sono cani a cui non dovrei somministrare Reconcile®?

Reconcile® è controindicato per l'uso in cani con epilessia o una storia di convulsioni, né il farmaco deve essere somministrato a cani con una nota ipersensibilità alla fluoxetina, ad altri SSRI o a uno qualsiasi degli eccipienti.

La sicurezza di Reconcile® non è stata stabilita in cani di età inferiore a 6 mesi o di peso inferiore a 4 kg.

La sicurezza del medicinale veterinario non è stata stabilita durante la gravidanza e l'allattamento, quindi il suo uso non è raccomandato durante la gravidanza e l'allattamento.

Quali effetti collaterali potrei vedere con Reconcile®?¹²

Gli eventi avversi più comuni segnalati in ordine decrescente di frequenza sono: diminuzione dell'appetito (inclusa anoressia), letargia (molto comuni), disturbi del tratto urinario (cistite, incontinenza urinaria, ritenzione urinaria, stranguria), scoordinamento o disorientamento, perdita di peso/ perdita di condizione o midriasi, affanno, convulsioni e vomito. Per minimizzare il rischio di effetti avversi, la dose raccomandata non dovrebbe essere superata.

Posso usare Reconcile® insieme ad altri farmaci?¹²

Reconcile® non deve essere somministrato in concomitanza con medicinali veterinari che abbassano la soglia convulsiva (ad esempio fenotiazine come l'acepromazina o la clorpromazina).

Non usare il prodotto in concomitanza con altri agenti serotoninergici (ad es. sertralina) e inibitori delle monoamino ossidasi (MAOI) [ad es. selegilina cloridrato (L-deprenyl), amitraz] o amine tricicliche (TCA) (ad es. amitriptilina e clomipramina).

Un intervallo di washout di 6 settimane deve essere osservato dopo l'interruzione della terapia con Reconcile® prima della somministrazione di qualsiasi medicinale veterinario che possa interagire negativamente con la fluoxetina o il suo metabolita, la norfluoxetina.

Inoltre il CSP afferma¹²: "La fluoxetina è ampiamente metabolizzata dal sistema enzimatico P-450, sebbene l'isoforma precisa nei cani sia sconosciuta. Pertanto, la fluoxetina deve essere usata con cautela con altri medicinali veterinari." Reconcile® masticabile.

Le compresse non sono state valutate con farmaci che influenzano il sistema enzimatico del citocromo P450. Le compresse masticabili Reconcile® devono essere usate con cautela quando sono somministrate insieme a qualsiasi farmaco che colpisce il sistema enzimatico del citocromo P450 (per esempio, ketoconazolo).

Devo controllare regolarmente il sangue di un paziente trattato con Reconcile®?¹²

Il CSP di Reconcile® non prevede l'obbligo di controllare regolarmente i parametri ematologici o biochimici dei pazienti in trattamento con Reconcile®. Reconcile® non ha causato effetti marcati o coerenti sull'ematologia, sulle analisi chimiche del sangue o sulle analisi delle urine in uno studio di sicurezza di un anno nei cani.¹¹ Come per qualsiasi paziente che assume farmaci, il giudizio professionale dovrebbe essere usato nel monitoraggio del paziente per la risposta alla terapia e per le reazioni avverse.



Informazioni sulla prescrizione:

Denominazione Del Medicinale Veterinario:

Reconcile® 8 mg compresse masticabili per cani
Reconcile® 16 mg compresse masticabili per cani
Reconcile® 32 mg compresse masticabili per cani
Reconcile® 64 mg compresse masticabili per cani.

Ciascuna compressa contiene: Principio attivo: Reconcile® 8 mg: Fluoxetina 8 mg (equivalenti a 9,04 mg di fluoxetina cloridrato), Reconcile® 16 mg: Fluoxetina 16 mg (equivalenti a 18,08 mg di fluoxetina cloridrato), Reconcile® 32 mg: Fluoxetina 32 mg (equivalenti a 36,16 mg di fluoxetina cloridrato), Reconcile® 64 mg: Fluoxetina 64 mg (equivalenti a 72,34 mg di fluoxetina cloridrato).

Indicazioni per l'utilizzazione: Come coadiuvante nel trattamento dei disordini correlati alla separazione nel cane, che si manifestano con comportamenti distruttivi e inappropriati (vocalizzazione e defecazione/urinazione inappropriata), esclusivamente in associazione con tecniche di modificazione comportamentale.

Specie di destinazione: Cani

Posologia e via di somministrazione: Reconcile® deve essere somministrato una volta al giorno per via orale alla dose di 1 - 2 mg/kg di peso corporeo, secondo la tabella posologica riportata di seguito:

PESO CORPOREO (KG)	DOSAGGIO DELLA COMPRESSA (MG)	N° DI COMPRESSE AL GIORNO
4 - 8	Reconcile® compressa da 8mg	1
> 8 - 16	Reconcile® compressa da 16mg	1
> 16 - 32	Reconcile® compressa da 32mg	1
> 32 - 64	Reconcile® compressa da 64mg	1

Il miglioramento clinico con il prodotto è atteso entro 1 - 2 settimane. Se dopo 4 settimane non si nota alcun miglioramento, deve essere rivalutata la gestione del caso. Gli studi clinici hanno dimostrato che una risposta positiva è stata accertata fino a 8 settimane di trattamento con fluoxetina. Le compresse di Reconcile possono essere somministrate indipendentemente dai pasti. Le compresse sono aromatizzate e la maggior parte dei cani assume la compressa quando offerta dal proprietario.

Se si salta una dose, deve essere somministrata la dose successiva programmata, come prescritto. Alla fine del trattamento, non è necessario diminuire gradualmente o ridurre la dose, a causa della lunga emivita di questo medicinale veterinario.

Controindicazioni: Non usare in cani che pesano meno di 4 kg. Non usare in cani con epilessia o con storia di convulsioni. Non usare in caso di ipersensibilità alla fluoxetina o ad altri

inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) o ad uno degli eccipienti.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: La sicurezza del prodotto non è stata stabilita nei cani con età inferiore ai 6 mesi o che pesano meno di 4 kg. Sebbene raramente, nei cani trattati con Reconcile possono manifestarsi convulsioni. In questo caso, il trattamento deve essere interrotto.

Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali:

In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta. Nell'uomo, i sintomi più comuni associati al sovradosaggio sono convulsioni, sonnolenza, nausea, tachicardia e vomito.

Reazioni avverse (frequenza e gravità):

Per rendere minimo il rischio di reazioni avverse, non deve essere superata la dose raccomandata.

- Diminuzione dell'appetito (inclusa l'anoressia); letargia (molto comuni).
- Patologie del tratto urinario (cistite, incontinenza urinaria, ritenzione urinaria, stranguria); segni del sistema nervoso centrale (incoordinazione, disorientamento) (comuni).
- Perdita di peso/di condizione; midriasi (non comuni).
- Reazioni avverse rare: respiro affannoso, convulsioni, vomito (rare).

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati manifesta reazioni avverse)
- comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati)
- rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati)
- molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti) se necessario:

A dosi in eccesso rispetto a quella raccomandata, vengono esacerbati gli effetti collaterali osservati alla dose terapeutica, comprese le convulsioni. Inoltre, si è osservato un comportamento aggressivo. Negli studi clinici, questi effetti collaterali sono stati interrotti immediatamente con la somministrazione endovenosa di una dose standard di diazepam.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

FORTE Healthcare Ltd, Cougar Lane, Naul, Co. Dublin, Ireland.

Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio: EU/2/08/080/001 - 004.

Medicinale veterinario soggetto a prescrizione.

Referenze:

1. Simpson BS, Landsberg GM, Reisner IR, et al. Effects of Reconcile (fluoxetine) chewable tablet plus behavior management for canine separation anxiety. Vet Ther. 2007;8(1):18-31.
2. Parthasarathy V, Crowell-Davis SL. Relationship between attachment to owners and separation anxiety in pet dogs (Canis lupus familiaris). J Vet Behav. 2006;1:109-120.
3. Bamberger M, Houpt KA. Signalment factors, comorbidity, and trends in behavior diagnoses in dogs: 1,644 cases (1991-2001). JAVMA. 2006;229(10):1593.
4. Tiira K, Sulkama S, Lohi H. Prevalence, comorbidity, and behavioral variation in canine anxiety. J Vet Behav. 2016;16:38.
5. Salman MoD, Hutchison J, Ruch-Gallie R, et al. Behavioral reasons for relinquishment of dogs and cats to 12 shelters. J Appl Anim Welfare Sci. 2000;3(2):95.
6. Schwartz S. Separation anxiety syndrome in dogs and cats. J Am Vet Med Assoc. 2003;22(11):1526-1532.
7. Blackwell E, Casey RA, Bradshaw WS. Controlled trial of behavioural therapy for separation-related disorders in dogs. Vet Rec. 2006;158:51-554.
8. Horwitz DF. Separation anxiety in dogs. NAVC Clinician's Brief. 2008;11:61-62.
9. Takeuchi Y, Houpt KA, Scarlett JM. Evaluation of treatments for separation anxiety in dogs. J Am Vet Med Assoc. 2000;17(3):342-345.
10. Toxicity study D3760. A One Year Chronic Toxicity Study with Two Month Recovery Phase of Fluoxetine Hydrochloride (LY110140) Administered Orally to Beagle Dogs. Freedom of Information Summary NADA 141-272; Reconcile Fluoxetine Hydrochloride Chewable Tablets: Dogs. 2007:9.
11. Field study T8E420001. Efficacy Evaluation of Fluoxetine (fluoxetine hydrochloride) for the Control of Separation Anxiety in Dogs. Freedom of Information Summary NADA 141-272; Reconcile Fluoxetine Hydrochloride Chewable Tablets: Dogs. 2007:3.
12. Reconcile Chewable Tablets for Dogs, Summary of Product Characteristics. 2021.
13. Reconcile European Public Assessment Record, accessed October 2021. https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-discussion/reconcile-epar-scientific-discussion_en.pdf
14. Amat, M., Camps, T., Brech, S. L., & Manteca, X. Separation anxiety in dogs: The implications of predictability and contextual fear for behavioural treatment. Animal Welfare. 2014; 23(3), 263-266.



Reconcile®

CHAOS TO CALM

- UNA VOLTA AL GIORNO, COMPRESSA MASTICABILE AROMATIZZATA – facile da somministrare per una conformità ottimale
- RIDUCE IL DISTURBO SIA PER L'ANIMALE CHE PER IL PROPRIETARIO, rafforzando il legame uomo-animale
- Materiale informativo per il proprietario e programma di modifica del comportamento CALM® per risultati ottimali



*Il nostro squadra è disponibile per fornire consigli e ulteriori informazioni. In caso di domande su **Reconcile** per favore contattare un membro del VetNova squadra via e-mail: vetnova@vetnova.net.*

VetNova

VETNOVA SALUD S.L.
c/ Fuente del Toro, 40. Nave 3.
28710 El Molar. España
Tel: + 34 918 440 273 · vetnova@vetnova.net